


Estudos realizados no Brasil demonstraram que:



QUALIDADE DE CARCAÇA

Criando Conexões

Fornecer técnicas comprovadas através de treinamentos on line, vídeos e seminários para ajudar a sua equipe a melhorar continuamente

O manejo adequado do gado pode reduzir os hematomas de carcaça e melhorar a segurança do manejador e o bem-estar animal.



Em **20.000** carcaças avaliadas **49%** apresentavam algum tipo de contusão⁽³⁾. Do Total de 4.438 animais avaliados **54%** apresentam algum tipo de lesão, com uma média de 2,74 contusões por animal contundido⁽²⁾.

Principais descobertas

Animais confinados classificados como nervosos comeram com menor frequência e cresceram mais lentamente, **OBTIVERAM MENOR GANHO DE PESO, MAIOR PROPENÇÃO A DOENÇAS** e maior proporção de cortes escuros⁽³⁾.

No Brasil em um levantamento de lesões realizado durante a inspeção na linha de abate, foi constatada uma perda anual de **US\$11,3** milhões⁽¹⁾.

Referências:

⁽¹⁾ MORO, E.; JUNQUERA, J. O.B.; UMEHARA, O. Levantamento a incidência de reações vacinais e/ou medicamentosas em carcaças de bovinos na desossa em frigoríficos no Brasil. *A Hora Veterinária*, v. 21, n.123, p. 55-57, 2001.

⁽²⁾ Mendonça S. F., 2015. Fatores pré-abate relacionados às contusões em carcaças bovinas. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Zootecnia, da Universidade Federal de Pelotas/RS

⁽³⁾ FELL, L. R.; COLDITZ, I. G.; WALKER, K. H.; WATSON, D. L. Associations between temperament, performance and immune function in cattle entering a commercial feedlot. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, v. 39, n. 7, p. 795-802, 1999.

TRABALHANDO JUNTOS
PARA O BEM ESTAR ANIMAL



MSD é Merck Sharp & Dohme.